江苏省地方标准

DB32/T 3682—2019

南方梨病害型早期落叶综合防控技术规程

Technical regulations for control of early abnormal leaf defoliation of
pear in south China

2019-12-03 发布

2019-12-25 实施

江苏省地方标准
南方梨病害型早期落叶综合防控技术规程

DB32/T 3682—2019

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2020年3月第一版

*

书号: 155066·5-1625

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由江苏省农业科学院提出并归口。

本标准起草单位：江苏省农业科学院、福建省农业科学院果树研究所、延边朝鲜族自治州农业科学院。

本标准主要起草人：刘凤权、黄新忠、孙伟波、周兰、赵延存、褚姝频。

南方梨病害型早期落叶综合防控技术规程

1 范围

本标准规定了南方梨病害型早期落叶综合防控技术、早期落叶发生后处理措施、防控记录及存档等要求。

本标准适用于我国南方梨产区病害型早期落叶的防控。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 8321(所有部分) 农药合理使用准则

NY/T 442 梨生产技术规程

NY/T 2157 梨主要病虫害防治技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

南方梨病害型早期落叶 **early abnormal leaf defoliation of pear in southern China**

长江流域及以南地区 10 月上旬以前,由炭疽病、黑斑病、黑星病等引起的梨树叶片大量脱落的现象。

4 综合防控技术

4.1 优化果园生态环境

4.1.1 选择适宜地块建园

选择通透性强、光照充足、方圆 5 km 范围内无桧柏类植物的开阔地块建园,避免在地域狭窄、地势低洼、四周郁闭的地块建园。

4.1.2 种植抗性品种

根据生态环境和气候特点,种植适宜当地发展的品质优良、丰产稳产、较抗早期落叶的品种,如“翠玉”“晚翠”“浙梨 2 号”“鄂梨 2 号”等。

4.1.3 选择适宜的株行距

常规栽培为 5 m×5 m;“双臂顺行式”棚架栽培为 5 m×3 m;“Y”字形树形栽培为 3 m×5 m。

4.1.4 选用单层主枝树形

常规栽培以三主枝开心形和两主枝“Y”字形为主,树干高 90 cm~100 cm 或以上;棚架栽培以“双