

团 体 标 准

T/CHATA 014—2021

糖尿病患者肺结核筛查规范

Pulmonary tuberculosis screening in patients with diabetes

2021-07-09 发布

2021-07-09 实施

中国防痨协会 发 布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 筛查对象	1
5 筛查方法	2
6 筛查流程	2
6.1 新诊断糖尿病患者	2
6.2 既往诊断的糖尿病患者	2
6.3 筛查流程图	3
7 疑似肺结核患者转诊	3
8 糖尿病患者开展肺结核筛查后报告	3
9 质量控制要求	3
10 糖尿病患者的肺结核筛查工作统计指标	3
10.1 糖尿病患者的肺结核可疑症状筛查率	3
10.2 肺结核可疑症状者的摄片率	3
10.3 具有肺结核高危因素的糖尿病患者的摄片率	4
附录 A (资料性) 糖尿病患者肺结核可疑症状筛查和危险因素评定	5
附录 B (资料性) 糖尿病患者肺结核筛查流程图	6
附录 C (规范性) 疑似肺结核患者转诊单	7
参考文献	8

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由江苏省疾病预防控制中心提出。

本文件由中国防痨协会归口。

本文件起草单位：江苏省疾病预防控制中心、中国疾病预防控制中心、中国防痨协会、国际防痨和肺部疾病联合会、南京市第二医院、东南大学附属中大医院、江苏省中西医结合医院、镇江市疾病预防控制中心、苏州市疾病预防控制中心。

本文件主要起草人：竺丽梅、刘剑君、成诗明、林岩、成君、钟球、陆伟、周金意、张侠、刘超、孙子林、杨兵全、曾谊、许卫国、蒋晖、蒋骏、丁晓艳、李燕、刘巧。

糖尿病患者肺结核筛查规范

1 范围

本文件规定了糖尿病患者中肺结核筛查的对象、方法、流程和时间间隔。

本文件适用于疾病预防控制机构、医疗卫生机构、基层社区卫生服务机构等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS 288—2017 肺结核诊断

WS 397—2012 糖尿病筛查和诊断

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

糖尿病患者 patients with diabetes

由于胰岛素分泌功能缺陷和(或)胰岛素作用缺陷所引起,以慢性高血糖伴碳水化合物、脂肪及蛋白质代谢障碍为主要特征的一组病因异质性的代谢性疾病。

3.2

新诊断糖尿病患者 newly diagnosed diabetes

根据 WS 397—2012,首次诊断为糖尿病的患者,有典型糖尿病症状(多饮、多尿、多食、体重下降)并伴有空腹血糖检测 ≥ 7.0 mmol/L(126 mg/dL)或口服葡萄糖耐量试验 2 h 血糖 ≥ 11.1 mmol/L(200 mg/dL)或随机血糖检测 ≥ 11.1 mmol/L(200 mg/dL);无明确的糖尿病症状者,伴有空腹血糖检测 ≥ 7.0 mmol/L(126 mg/dL)或口服葡萄糖耐量试验 2 h 血糖 ≥ 11.1 mmol/L(200 mg/dL),并且需在另一天进行复查核实。

3.3

既往诊断糖尿病患者 known diabetes

既往确诊糖尿病并且使用药物进行干预的糖尿病患者。

4 筛查对象

在医疗卫生机构新诊断的糖尿病患者和纳入基本公共卫生服务项目随访管理的糖尿病患者均为肺结核筛查对象。符合以下条件之一者是重点筛查对象。

- 所有新诊断的糖尿病患者。
- 既往诊断的糖尿病患者,且具有肺结核可疑症状。
- 既往诊断的糖尿病患者,且具有下列任何一项结核病高危因素: