

江苏省地方标准

DB32/T 3648—2019

‘玉霞蟠桃’生产技术规范

Technical regulation for production of ‘Yuxiapantao’

2019-09-19 发布

2019-10-31 实施

江苏省市场监督管理局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由江苏省农业科学院提出并归口。

本标准起草单位：江苏省农业科学院。

本标准主要起草人：张斌斌、马瑞娟、俞明亮、宋宏峰、许建兰、郭磊。

‘玉霞蟠桃’生产技术规程

1 范围

本标准规定了‘玉霞蟠桃’生产的产地环境条件、园地选择与规划、定植、土肥水管理、整形修剪、花果管理、病虫害防治、采收和记录。

本标准适用于‘玉霞蟠桃’的露地栽培。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 17419 含氨基酸叶面肥料

NY/T 496 肥料合理使用准则 通则

NY/T 5010 无公害农产品 种植业产地环境条件

DB32/T 469 桃生产技术规程

3 产地环境条件

产地环境条件应符合 NY/T 5010 的规定。

4 园地选择与规划

园地选择与规划参见 DB32/T 469,要求园地地下水位低于 1 m,土层深厚,土质疏松,地势开阔,水源充足,远离工矿区、工业污染源和城市污染源。避免在重茬地建园。根据果园所处地形条件和建园规模划分成多个小区,小区内土壤条件基本一致。

5 定植

5.1 定植方式

5.1.1 常规栽培

地下水位低、丘陵岗地等地区采用常规栽培方式。霜冻前挖定植沟或定植穴。定植沟的深度 40 cm~60 cm,宽度 1 m,与排水沟连通;定植穴深度 60 cm,长度 60 cm,宽度 60 cm。挖出的表土、心土分开放置。先在沟或穴底部放入秸秆、树枝碎屑等粗质有机物,以有机肥料和表土混匀后回填,每定植点施有机肥 25 kg,所用肥料应符合 NY/T 394 中的规定,分层压入。

5.1.2 起垄栽培

地下水位高、缓坡平地采用起垄栽培。定植前对瘠薄地、黏重土壤要适当深翻,增施有机肥,提高土壤肥力,改良土壤。起垄栽培的垄宽 1.2 m,高 30 cm,相邻两垄中心线的距离不低于 5 m,苗木定植在